

「亞托敏」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 7 月 11 日農授防字第 1131876262B 號公告修正

10(%) (w/w) 亞托敏 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
落花 生、 綠豆、 紅豆、 大豆、 花豆、 樹豆、 蠶豆、 豇豆、 菜豆、 菜豆、 豌豆	露菌病	1.25-2 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		本 項 修 正。
	疫病	1.25-2 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		本 項 修 正。
落花生	銹病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	10			7		
油菜	露菌病	0.3-1.3 公升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7			7	適用於油菜 籽。	
茶	赤葉枯 病	1.3-3.8 公升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7			21	適用於茶 籽。	本 項 修 正。
油茶	赤葉枯 病	1.3-3.8 公升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		本 項 修 正。
胡麻	疫病	1.5-3 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			7		
胡麻	疫病	1.5-3 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			7	1. 避免與 高浸透 性展著 劑混合 使用。	重 複 範 圍，本項 刪除。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									2. 高溫下施用，注意避免發生藥害。	
十字花科包葉菜類	露菌病	1.25 公升	800	病害發生初期開始施藥。	7	3		15		
菊科包葉菜類	露菌病	0.25-1.25 公升	800	病害發生初期開始施藥。	7			15		重複範圍，本項刪除。
結球萵苣	疫病	0.75-2.5 公升	400	病害發生初期開始施藥。	7			15		本項修正。
結球萵苣	露菌病	1.25 公升	800	病害發生初期開始施藥。	7	3		15		
旋花科小葉菜類	露菌病	1.1 公升	900	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
旋花科小葉菜類	白銹病	1.1 公升	900	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
豆科小葉菜類	露菌病	1.1 公升	900	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									生藥害。	
豌豆	疫病	1.3-2 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			10	適用於葉用 豌豆。	
十字花 科小葉 菜類	露菌病	0.3-1.3 公升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
菊科小 葉菜類	露菌病	1.1 公 升	900	病害發生 初期開始 施藥。	7			10	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
菊科小 葉菜類	疫病	0.75-2.5 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
菊科小 葉菜類	白銹病	1.1 公 升	900	病害發生 初期開始 施藥。	7			10	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
不結球 萵苣與 半結球 萵苣	露菌病	1.25 公 升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		10	採收前10 天(設施栽 培12天) 停止施藥。	與大類 範圍重 疊，本項 刪除。
茄科小 葉菜類	疫病	1.25- 3.75 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			12	採收前6天 (設施栽培 12天)停止 施藥。	
蔥科小 葉菜類	紫斑病	1-1.25 公升	1,200	病害發生 初期開始 施藥。	10			10		
蔥科小 葉菜類	露菌病	1.1 公 升	900	病害發生 初期開始	7			10	避免與高浸 透性展著劑	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				施藥。					混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
蔥科小 葉菜類	疫病	2-5 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
蔥	紫斑病	1-1.25 公升	1,200	病害發生 初期開始 施藥。	10			10		與大類 範圍重 疊，本 項刪 除。
韭	紫斑病	1-1.25 公升	1,200	病害發生 初期開始 施藥。	10			10		與大類 範圍重 疊，本 項刪 除。
葫蘆科 小葉菜 類	露菌病	1.1 公 升	900	病害發生 初期開始 施藥。	7			6	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
龍鬚菜	疫病	1.9-5 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
繖形花 科小葉 菜類	葉斑病	1.1 公 升	900	病害發生 初期開始 施藥。	7			10	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
羅勒	露菌病	1.1 公 升	900	病害發生 初期開始	7			10	避免與高浸 透性展著劑	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				施藥。					混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
羅勒	疫病	0.6-1.9 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
紫蘇	疫病	0.6-1.9 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
仙草	疫病	0.6-1.9 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
薄荷	疫病	0.6-1.9 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
藜科小 葉菜類	露菌病	1.1 公 升	900	病害發生 初期開始 施藥。	7			10	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
菠菜	露菌病	0.25- 1.25 公 升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		與大類 範圍重 疊，本 項刪 除。
莧科小 葉菜類	露菌病	1.1 公 升	900	病害發生 初期開始 施藥。	7			10	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
莧科小	白銹病	1.1 公	900	病害發生	7			10	避免與高浸	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
葉菜類		升		初期開始施藥。					透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
莧菜	疫病	0.8-2.5公升	400	病害發生初期開始施藥。	7			10		
香椿	疫病	0.6-2.5公升	400	病害發生初期開始施藥。	7			10		
豆科根菜類	露菌病	1.25公升	800	病害發生初期開始施藥。	7			7		
豆科根菜類	疫病	1.25-2公升	400	病害發生初期開始施藥。	7			7		
十字花科根菜類	露菌病	0.3-1.3公升	800	病害發生初期開始施藥。	7			10		
菊科根菜類	露菌病	1.25公升	800	病害發生初期開始施藥。	7			7		
茄科根菜類	疫病	1.25-3.75公升	400	病害發生初期開始施藥。	7			12	採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。	
馬鈴薯	晚疫病	2.5公升	400	病害發生初期開始施藥。	7			6		
蔥科根菜類	紫斑病	1-1.25公升	1,200	病害發生初期開始施藥。	10			10		
蔥科根菜類	露菌病	1.25公升	800	病害發生初期開始施藥。	7			10		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
蔥科根 菜類	疫病	2-5 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
甜菜	疫病	0.6-1.9 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
薑	疫病	2.3-3 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		重複範圍，本 項刪除。
薑	疫病	2.25-3 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
金針	疫病	2-5 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			6	適用於碧玉 筍。	
芋	疫病	2-3 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		重複範圍，本 項刪除。
芋	疫病	2-3 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
茄科果 菜類	疫病	1.25- 3.75 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			12	採收前 6 天 (設施栽培 12 天)停止 施藥。	
番茄	晚疫病	2.5 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
金針	疫病	2-5 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			6	適用於金針 花。	
洛神葵	疫病	1.5-3 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
秋葵	疫病	1.5-3 公	400	病害發生	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		升		初期開始 施藥。						
瓜菜類	疫病	1.9-5 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
胡瓜	露菌病	1.25 公 升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		6		
豆菜類	露菌病	1.25 公 升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
豆菜類	疫病	1.25-2 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			14	豆菜類採收 前 14 天、 豆苗採收前 10 天停止 施藥。	
瓜果類	露菌病	1.25 公 升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7	3-4		6		
瓜果類	疫病	1.9-5 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
香蕉	炭疽病	1.25 公 升	800	開花初期 施藥。	7			12		
香蕉	黑星病	0.9 公 升	每公頃 加水稀 釋至 30 公升	病害發生 初期開始 施藥。	14		動力噴 霧器噴 於心葉 及其它 葉片。	12	施藥時如有 抽穗蕉株， 果房應先行 套袋，以免 藥害。	
木瓜	疫病		400	雨季來臨 時施藥。	7			9		
木瓜	炭疽病		1,000	開花盛期 施藥。	10			9		
番荔枝	炭疽病	1-2 公 升	800	開花初期 施藥。	7			12		
酪梨	炭疽病		800	開花結果 期及套袋	10-14	各 2 次		6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				前施藥。						
紅龍果	炭疽病	1-2 公 升	800	開花初期 施藥。	7			12		
百香果	炭疽病	1-2 公 升	800	開花初期 施藥。	7			12		
紅毛丹	炭疽病	0.75-1.5 公升	800	開花初期 施藥。	7			12		
草莓	果腐病	2-5 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			12	採收前 6 天 (設施栽培 12 天)停止 施藥。	重複範 圍，本 項刪 除。
草莓	果腐病	2-5 公 升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			12	採收前 6 天 (設施栽培 12 天)停止 施藥。	
葡萄	露菌病	1.5 公 升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7-10	3-4		6		
葡萄	晚腐病		800	開花初期 施藥。	10			30		
楊桃	炭疽病	1-2 公 升	800	開花初期 施藥。	7			12	施藥至套袋 前為止。	
蓮霧	炭疽病		1,200	開花盛期 施藥。	10	5-8	結果後 每 14 天 施一 次。	6		
番石榴	炭疽病		800	花謝後施 藥。	10			21	於套袋前可 再施藥一 次，待藥液 乾後立即套 袋。	
無花果	炭疽病	1-2 公 升	800	小果期施 藥。	7			12		
龍眼	炭疽病	0.8-1.7 公升	900	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
荔枝	炭疽病		800	雨季來臨	7			12	與其他藥劑	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				時或病害 發生初期 開始施 藥。					輪流施用可 避免抗藥性 產生。	
檬果	炭疽病		800	開花初期 施藥。	7	4	結果後 每 14 天 施一 次。	12	同一季節避 免施六次。	
梨	炭疽病	1.25-2.5 公升	800	開花初期 施藥。	7			6		
梨	輪紋病		1,200	花謝後施 藥。	10-14	6		6		
蘋果	炭疽病	1.25-1.5 公升	800	開花初期 施藥。	7			9		
桃	炭疽病	1.25-2.5 公升	800	開花初期 施藥。	7			9		
梅	炭疽病	1.5-2.25 公升	800	開花初期 施藥。	7			9		
枇杷	炭疽病	2-2.5 公 升	800	開花初期 施藥。	7			9		
鼠李科 梨果類	炭疽病		1,200	病害發生 初期開始 施藥。	10-14	2-3		9		
柿	炭疽病	1.25-2 公升	800	開花初期 施藥。	7			9		
柑桔類	炭疽病	1.1-2.7 公升	900	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
柑桔類	瘡痂病		1,200	花苞將開 放時行第 一次施 藥，結小 果時行第 二次施 藥，隔三 星期再行 第三次施		3		6	1. 每公頃 之施藥 量視植 株大小 而異， 藥量可 酌情增 減。 2. 剪除植	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。					株病患 部位， 另田間 之落 花、枯 枝與落 果，均 須清除 並燒燬 之。	
椰子	炭疽病	0.6-2.2 公升	900	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
花木	露菌病	1.5-6.3 公升	400	發病初期 開始施 藥。	7	最多 2 次			限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
花木	疫病	1.5-6.3 公升	400	發病初期 開始施 藥。	7	最多 2 次			限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
花木	炭疽病	1.5-6.3 公升	400	發病初期 開始施 藥。	7	最多 2 次			限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
菊	露菌病	0.5-1.5 公升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
菊	疫病	0.75-3 公升	400	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
山茶	<u>赤葉枯 病</u>	1.3-3.8 公升	800	病害發生 初期開始 施藥。	7					本項修 正。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
茶	赤葉枯病	1.3-3.8公升	800	病害發生初期開始施藥。	7			21	適用於茶葉。	本項修正。
茶	赤葉枯病	1.25-3.75公升	800	病害發生初期開始施藥。	7			21		重複範圍，本項刪除。
黃耆	露菌病	0.6-1公升	800	病害發生初期開始施藥。	7			21		
黃耆	疫病	1.3-2公升	400	病害發生初期開始施藥。	7			21		
當歸	疫病	0.6-1.9公升	400	病害發生初期開始施藥。	7			21		
丹參	疫病	0.6-1.9公升	400	病害發生初期開始施藥。	7			21		
咖啡	炭疽病	0.8-1.7公升	900	病害發生初期開始施藥。	7			14	避免與滲透性強的展著劑混合使用，以免發生藥害。	
地黃	疫病	0.6-1.9公升	400	病害發生初期開始施藥。	7			21		
可可	炭疽病	1-2.2公升	900	病害發生初期開始施藥。	7			14	避免與滲透性強的展著劑混合使用，以免發生藥害。	
百慕達草	褐斑病	1.75公升	600	病害發生初期開始施藥。	10	3				

23(%) (w/w) 亞托敏 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
落花 生、 綠豆、 紅豆、 大豆、 花豆、	露菌病	0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		本項修正。
樹豆、 蠶豆、 豇豆、 菜豆、 菜豆、 豌豆	疫病	0.5-0.8 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		本項修正。
落花生	銹病	0.5-0.8 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		
油菜	露菌病	0.1-0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			7	適用於油菜籽。	
茶	赤葉枯病	0.5-1.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			21	適用於茶籽。	本項修正。
油茶	赤葉枯病	0.5-1.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			21		本項修正。
胡麻	疫病	0.6-1.2 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			7	1. 避免與高浸透性展著劑混合使用。 2. 高溫下施用，注意避免發生藥害。	
十字花科包葉	露菌病	0.5 公升	2,000	病害發生初期開始	7	3		15		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
菜類				施藥。						
菊科包葉菜類	露菌病	0.1-0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			15		重複範圍，本項刪除。
菊科包葉菜類	露菌病	0.1-0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			15		重複範圍，本項刪除。
結球萵苣	疫病	0.3-1公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			15		本項修正。
結球萵苣	露菌病	0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7	3		12	採收前6天（設施栽培12天）停止施藥。	
旋花科小葉菜類	露菌病	0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
旋花科小葉菜類	白銹病	0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
豆科小葉菜類	露菌病	0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
十字花科小葉	露菌病	0.1-0.5公升	2,000	病害發生初期開始	7			10		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
菜類				施藥。						
菊科小葉菜類	露菌病	0.1-0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		重複範圍，本項刪除。
菊科小葉菜類	露菌病	0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
菊科小葉菜類	露菌病	0.1-0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		重複範圍，本項刪除。
菊科小葉菜類	疫病	0.3-1公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
菊科小葉菜類	白銹病	0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
不結球萵苣與半結球萵苣	露菌病	0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7	3		12	採收前6天（設施栽培12天）停止施藥。	
茄科小葉菜類	疫病	0.5-1.5公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			12	採收前6天（設施栽培12天）停止施藥。	
蔥科小葉菜類	紫斑病	0.4-0.5公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	10			10		
蔥科小葉菜類	露菌病	0.5公升	2,000	病害發生初期開始	7			10	避免與高浸透性展著劑	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				施藥。					混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
蔥科小 葉菜類	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		重複範 圍，本 項刪 除。
蔥科小 葉菜類	疫病	0.8-2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
蔥	紫斑病	0.4-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	10			10	本藥劑試驗 時加展著劑 「嘉展 (Agral90)」 1,500 倍。	
韭	紫斑病	0.4-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	10			10	本藥劑試驗 時加展著劑 「Agral90 」1,500 倍。	與大類 範圍重 疊，本 項刪 除。
葫蘆科 小葉菜 類	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
龍鬚菜	疫病	0.8-2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
繖形花 科小葉 菜類	葉斑病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									用，以免發生藥害。	
羅勒	露菌病	0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
羅勒	疫病	0.3-0.8 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
紫蘇	疫病	0.3-0.8 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
仙草	疫病	0.3-0.8 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			21		
薄荷	疫病	0.3-0.8 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			21		
藜科小葉菜類	露菌病	0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
菠菜	露菌病	0.1-0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		與大類範圍重疊，本項刪除。
莧科小葉菜類	露菌病	0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									多濕下施用，以免發生藥害。	
莧科小葉菜類	白銹病	0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
莧菜	疫病	0.3-1 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
香椿	疫病	0.3-1 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
豆科根菜類	露菌病	0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		
豆科根菜類	疫病	0.5-0.8 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		
十字花科根菜類	露菌病	0.1-0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
菊科根菜類	露菌病	0.1-0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		
菊科根菜類	露菌病	0.1-0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7	3		10		重複範圍，本項刪除。
茄科根菜類	疫病	0.5-1.5 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			12	採收前 6 天(設施栽培 12 天)停止施藥。	
馬鈴薯	晚疫病	1 公升	1,000	病害發生	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				初期開始 施藥。						
蔥科根 菜類	紫斑病	0.4-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	10			10		
蔥科根 菜類	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
蔥科根 菜類	疫病	0.8-2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
甜菜	疫病	0.3-0.8 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
薑	疫病	0.9-1.2 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
金針	疫病	0.8-2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6	適用於碧玉 筍。	
芋	疫病	0.8-1.2 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
茄科果 菜類	疫病	0.5-1.5 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			12	採收前 6 天 (設施栽培 12 天)停止 施藥。	
番茄	晚疫病	1 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
金針	疫病	0.8-2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6	適用於金針 花。	
洛神葵	疫病	0.6-1.2 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
秋葵	疫病	0.6-1.2	1,000	病害發生	7			6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		初期開始 施藥。						
瓜菜類	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		6		
瓜菜類	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		6		重複範 圍，本 項刪 除。
瓜菜類	疫病	0.8-2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
瓜菜類	蔓枯病	0.25 公 升	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	4		6		
胡瓜	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		6		
豆菜類	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
豆菜類	疫病	0.5-0.8 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			14	豆菜類採收 前 14 天、 豆苗採收前 10 天停止 施藥。	
瓜果類	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3-4		6		
瓜果類	疫病	0.8-2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
瓜果類	蔓枯病	0.25 公 升	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3-4		6		
香蕉	炭疽病	0.1-0.5 公升	2,000	開花初期 施藥。	7			12		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
香蕉	黑星病	0.4 公升	加水至 30 公升/公頃	病害發生初期開始施藥。	14		動力噴霧器噴於心葉及其它葉片。	12	施藥時如有抽穗蕉株，果房應先行套袋，以免藥害；本劑試驗時加展著劑「Agris90」1,500 倍。	本項修正。
木瓜	疫病		1,000	雨季來臨時施藥。	7			9		
木瓜	炭疽病		2,500	開花盛期施藥。	10			9		
番荔枝	炭疽病	0.4-0.8 公升	2,000	開花初期施藥。	7			12		
酪梨	炭疽病		2,000	開花結果期及套袋前施藥。	10-14	各 2 次		6		
紅龍果	炭疽病	0.4-0.8 公升	2,000	開花初期施藥。	7			12		
百香果	炭疽病	0.4-0.8 公升	2,000	開花初期施藥。	7			12		
紅毛丹	炭疽病	0.3-0.6 公升	2,000	開花初期施藥。	7			12		
草莓	果腐病	0.8-2 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			12	採收前 6 天(設施栽培 12 天)停止施藥。	重複範圍，本項刪除。
草莓	果腐病	0.8-2 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			12	採收前 6 天(設施栽培 12 天)停止施藥。	
葡萄	露菌病	0.6 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7-10	3-4		6		
葡萄	晚腐病	0.4-0.8	2,000	病害發生	7			6	施藥至套袋	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公升		初期開始 施藥。					前為止。	
楊桃	炭疽病	0.4-0.8 公升	2,000	開花初期 施藥。	7			12	施藥至套袋 前為止。	
蓮霧	炭疽病		3,000	開花盛期 施藥。	10	5-8	結果後 每 14 天 施一次	6	本藥劑試驗 時加展著劑 Agral90， 2,000 倍。	
番石榴	炭疽病		2,000	花謝後施 藥。	10			21	於套袋前可 再施藥一 次，待藥液 乾後立即套 袋。	
無花果	炭疽病	0.4-0.8 公升	2,000	小果期施 藥。	7			12		
龍眼	炭疽病	0.4-0.8 公升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
荔枝	炭疽病		2,000	雨季來臨 時或病害 發生初期 開始施 藥。	7			12	1. 本藥劑 試驗 時，添 加展著 劑 「Agra l90」 2,000 倍。 2. 與其他 藥劑輪 流施用 可避免 抗藥性 產生。	
檬果	炭疽病		2,000	開花初期 施藥。	7	4	結果後 每 14 天 施一次	12	加展著劑 Agral90， 2,000 倍。 同一季節避	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									免施六次	
梨	炭疽病	0.5-1 公升	2,000	開花初期施藥。	7			6		
梨	輪紋病		3,000	花謝後施藥。	10-14	6		6		
蘋果	炭疽病	0.5-0.6 公升	2,000	開花初期施藥。	7			9		
桃	炭疽病	0.5-1 公升	2,000	開花初期施藥。	7			9		
梅	炭疽病	0.6-0.9 公升	2,000	開花初期施藥。	7			9		
枇杷	炭疽病	0.8-1 公升	2,000	開花初期施藥。	7			9		
鼠李科 梨果類	炭疽病		3,000	病害發生初期開始施藥。	10-14	2-3		9		
柿	炭疽病	0.5-0.8 公升	2,000	開花初期施藥。	7			9		
柑桔類	炭疽病	0.5-1.2 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			6		
柑桔類	瘡痂病		3,000	<u>花苞將開放時行第一次施藥，結小果時行第二次施藥，隔三星期再行第三次施藥。</u>		3		6	1. <u>每公頃之施藥量視植株大小而異，藥量可酌情增減。</u> 2. <u>剪除植株病患部位，另田間之落花、枯枝與落果，均</u>	本項修正。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
									<u>須清除 並燒燬 之。</u>	
椰子	炭疽病	0.3-1 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
花木	露菌病	0.6-2.5 公升	1,000	發病初期 開始施 藥。	7	最多 2 次			限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
花木	疫病	0.6-2.5 公升	1,000	發病初期 開始施 藥。	7	最多 2 次			限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
花木	炭疽病	0.6-2.5 公升	1,000	發病初期 開始施 藥。	7	最多 2 次			限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
菊	露菌病	0.2-0.6 公升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
菊	疫病	0.3-1.2 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
山茶	<u>赤葉枯 病</u>	0.5-1.5 公升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7					本項修 正。
茶	<u>赤葉枯 病</u>	0.5-1.5 公升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21	適用於茶 葉。	本項修 正。
茶	<u>赤葉枯 病</u>	0.5-1.5 公升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		重複範 圍，本 項刪 除。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
當歸	疫病	0.3-0.8 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
丹參	疫病	0.3-0.8 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
咖啡	炭疽病	0.4-0.8 公升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			14	避免與滲透 性強的展著 劑混合使 用，以免發 生藥害。	
地黃	疫病	0.3-0.8 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
可可	炭疽病	0.5-1 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			14	避免與滲透 性強的展著 劑混合使 用，以免發 生藥害。	
百慕達 草	褐斑病	0.7 公 升	1,500	病害發生 初期開始 施藥。	10	3				
紅龍果	炭疽病	0.4-0.8 公升	2,000	病害發生 時全株均 勻施藥 1 次。				8	適用於紅龍 果花。	本項新 增。

250 g/L (25% w/v) 亞托敏 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
落花生、 綠豆、 紅豆、 大豆、 花豆、 樹豆、 蠶豆、 豇豆、 菜豆、 菜豆、 豌豆	露菌病	0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		本項修正。
	疫病	0.5-0.8 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		本項修正。
落花生	銹病	0.5-0.8 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		
油菜	露菌病	0.1-0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			7	適用於油菜籽。	
茶	赤葉枯病	0.5-1.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			21	適用於茶籽。	本項修正。
油茶	赤葉枯病	0.5-1.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			21		本項修正。
胡麻	疫病	0.6-1.2 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			7	1. 避免與高浸透性展著劑混合使用。 2. 高溫下施用，注意避免發生藥害。	
十字花科包葉	露菌病	0.5 公升	2,000	病害發生初期開始	7	3		15		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
菜類				施藥。						
菊科包葉菜類	露菌病	0.1-0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			15		重複範圍，本項刪除。
菊科包葉菜類	露菌病	0.1-0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			15		重複範圍，本項刪除。
結球萵苣	疫病	0.3-1公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			15		本項修正。
結球萵苣	露菌病	0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7	3		12	採收前6天（設施栽培12天）停止施藥。	
旋花科小葉菜類	露菌病	0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
旋花科小葉菜類	白銹病	0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
豆科小葉菜類	露菌病	0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
十字花科小葉菜類	露菌病	0.1-0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
菊科小葉菜類	露菌病	0.1-0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		重複範圍，本項刪除。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
菊科小葉菜類	露菌病	0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
菊科小葉菜類	露菌病	0.1-0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		重複範圍，本項刪除。
菊科小葉菜類	疫病	0.3-1 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
菊科小葉菜類	白銹病	0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
不結球萵苣與半結球萵苣	露菌病	0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7	3		12	採收前 6 天（設施栽培 12 天）停止施藥。	
茄科小葉菜類	疫病	0.5-1.5 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			12	採收前 6 天(設施栽培 12 天)停止施藥。	
蔥科小葉菜類	紫斑病	0.4-0.5 公升	3,000	病害發生初期開始施藥。	10			10		
蔥科小葉菜類	露菌病	0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		重複範圍，本項刪除。
蔥科小葉菜類	露菌病	0.5 公升	2,000	病害發生初期開始	7			10	避免與高浸透性展著劑	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				施藥。					混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
蔥科小 葉菜類	疫病	0.8-2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
蔥	紫斑病	0.4-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	10			10	本藥劑試驗 時加展著劑 「嘉展 (Agral90)」 1,500 倍。	
韭	紫斑病	0.4-0.5 公升	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	10			10	本藥劑試驗 時加展著劑 「Agral90」 1,500 倍。	與大類 範圍重 疊，本 項刪 除。
葫蘆科 小葉菜 類	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
龍鬚菜	疫病	0.8-2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
繖形花 科小葉 菜類	葉斑病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
羅勒	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始	7			10	避免與高浸 透性展著劑	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				施藥。					混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
羅勒	疫病	0.3-0.8 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
紫蘇	疫病	0.3-0.8 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
仙草	疫病	0.3-0.8 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
薄荷	疫病	0.3-0.8 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
藜科小 葉菜類	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
菠菜	露菌病	0.1-0.5 公升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		與大類 範圍重 疊，本 項刪 除。
莧科小 葉菜類	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
莧科小	白銹病	0.5 公	2,000	病害發生	7			10	避免與高浸	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
葉菜類		升		初期開始施藥。					透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
莧菜	疫病	0.3-1 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
香椿	疫病	0.3-1 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
豆科根菜類	露菌病	0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		
豆科根菜類	疫病	0.5-0.8 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		
十字花科根菜類	露菌病	0.1-0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
菊科根菜類	露菌病	0.1-0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		
菊科根菜類	露菌病	0.1-0.5 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7	3		10		重複範圍，本項刪除。
茄科根菜類	疫病	0.5-1.5 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			12	採收前 6 天(設施栽培 12 天)停止施藥。	
馬鈴薯	晚疫病	1 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			6		
蔥科根菜類	紫斑病	0.4-0.5 公升	3,000	病害發生初期開始	10			10		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				施藥。						
蔥科根 菜類	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
蔥科根 菜類	疫病	0.8-2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
甜菜	疫病	0.3-0.8 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
薑	疫病	0.9-1.2 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
金針	疫病	0.8-2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6	適用於碧玉 筍。	
芋	疫病	0.8-1.2 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
茄科果 菜類	疫病	0.5-1.5 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			12	採收前 6 天 (設施栽培 12 天)停止 施藥。	
番茄	晚疫病	1 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
金針	疫病	0.8-2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6	適用於金針 花。	
洛神葵	疫病	0.6-1.2 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
秋葵	疫病	0.6-1.2 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
瓜菜類	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始	7	3		6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				施藥。						
瓜菜類	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		6		重複範 圍，本 項刪 除。
瓜菜類	疫病	0.8-2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
瓜菜類	蔓枯病	0.25 公 升	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	4		6		
胡瓜	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		6		
豆菜類	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
豆菜類	疫病	0.5-0.8 公升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			14	豆菜類採收 前 14 天、 豆苗採收前 10 天停止 施藥。	
瓜果類	露菌病	0.5 公 升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3-4		6		
瓜果類	疫病	0.8-2 公 升	1,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
瓜果類	蔓枯病	0.25 公 升	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3-4		6		
香蕉	炭疽病	0.1-0.5 公升	2,000	開花初期 施藥。	7			12		
香蕉	黑星病	0.4 公 升	加水至 30 公升 /公頃	病害發生 初期開始 施藥。	14		動力噴 霧器噴 於心葉 及其它	12	施藥時如有 抽穗蕉株， 果房應先行 套袋，以免	本項修 正。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
							葉片		藥害；本劑試驗時加展著劑「Agris90」1,500 倍	
木瓜	疫病		1,000	雨季來臨時施藥。	7			9		
木瓜	炭疽病		2,500	開花盛期施藥。	10			9		
番荔枝	炭疽病	0.4-0.8 公升	2,000	開花初期施藥。	7			12		
酪梨	炭疽病		2,000	開花結果期及套袋前施藥。	10-14	各 2 次		6		
紅龍果	炭疽病	0.4-0.8 公升	2,000	開花初期施藥。	7			12		
百香果	炭疽病	0.4-0.8 公升	2,000	開花初期施藥。	7			12		
紅毛丹	炭疽病	0.3-0.6 公升	2,000	開花初期施藥。	7			12		
草莓	果腐病	0.8-2 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			12	採收前 6 天(設施栽培 12 天)停止施藥。	
草莓	果腐病	0.8-2 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			12	採收前 6 天(設施栽培 12 天)停止施藥。	重複範圍，本項刪除。
葡萄	露菌病	0.6 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7-10	3-4		6		
葡萄	晚腐病	0.4-0.8 公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			6	施藥至套袋前為止。	
楊桃	炭疽病	0.4-0.8 公升	2,000	開花初期施藥。	7			12	施藥至套袋前為止。	
蓮霧	炭疽病		3,000	開花盛期	10	5-8	結果後	6	本藥劑試驗	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				施藥。			每 14 天 施一 次。		時加展著劑 Agral90， 2,000 倍。	
番石榴	炭疽病		2,000	花謝後施 藥。	10			21	於套袋前可 再施藥一 次，待藥液 乾後立即套 袋。	
無花果	炭疽病	0.4-0.8 公升	2,000	小果期施 藥。	7			12		
龍眼	炭疽病	0.4-0.8 公升	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
荔枝	炭疽病		2,000	雨季來臨 時或病害 發生初期 開始施 藥。	7			12	1. 本藥劑 試驗 時，添 加展著 劑 「Agra l90」 2,000 倍。 2. 與其他 藥劑輪 流施用 可避免 抗藥性 產生。	
檬果	炭疽病		2,000	開花初期 施藥。	7	4	結果後 每 14 天 施一 次。	12	加展著劑 Agral90， 2,000 倍。 同一季節避 免施六次	
梨	炭疽病	0.5-1 公 升	2,000	開花初期 施藥。	7			6		
梨	輪紋病		3,000	花謝後施 藥。	10-14	6		6		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
蘋果	炭疽病	0.5-0.6公升	2,000	開花初期施藥。	7			9		
桃	炭疽病	0.5-1公升	2,000	開花初期施藥。	7			9		
梅	炭疽病	0.6-0.9公升	2,000	開花初期施藥。	7			9		
枇杷	炭疽病	0.8-1公升	2,000	開花初期施藥。	7			9		
鼠李科梨果類	炭疽病		3,000	病害發生初期開始施藥。	10-14	2-3		9		
柿	炭疽病	0.5-0.8公升	2,000	開花初期施藥。	7			9		
柑桔類	炭疽病	0.5-1.2公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			6		
柑桔類	瘡痂病		3,000	<u>花苞將開放時行第一次施藥，結小果時行第二次施藥，隔三星期再行第三次施藥。</u>		3		6	1. <u>每公頃之施藥量視植株大小而異，藥量可酌情增減。</u> 2. <u>剪除植株病患部位，另田間之落花、枯枝與落果，均須清除並燒燬之。</u>	本項修正。
椰子	炭疽病	0.3-1公升	2,000	病害發生初期開始	7			12		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				施藥。						
花木	露菌病	0.6-2.5公升	1,000	發病初期開始施藥。	7	最多2次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
花木	疫病	0.6-2.5公升	1,000	發病初期開始施藥。	7	最多2次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
花木	炭疽病	0.6-2.5公升	1,000	發病初期開始施藥。	7	最多2次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
菊	露菌病	0.2-0.6公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			21		
菊	疫病	0.3-1.2公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			21		
山茶	<u>赤葉枯病</u>	0.5-1.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7					本項修正。
茶	<u>赤葉枯病</u>	0.5-1.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			21	適用於茶葉。	本項修正。
茶	赤葉枯病	0.5-1.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			21		重複範圍，本項刪除。
當歸	疫病	0.3-0.8公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			21		
丹參	疫病	0.3-0.8公升	1,000	病害發生初期開始	7			21		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				施藥。						
咖啡	炭疽病	0.4-0.8公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			14	避免與滲透性強的展著劑混合使用，以免發生藥害。	
地黃	疫病	0.3-0.8公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			21		
可可	炭疽病	0.5-1公升	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			14	避免與滲透性強的展著劑混合使用，以免發生藥害。	
百慕達草	褐斑病	0.7公升	1,500	病害發生初期開始施藥。	10	3				

50(%) (w/w) 亞托敏 水分散性粒劑 (WG)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
落花生、綠豆、紅豆、大豆、花豆、樹豆、蠶豆、豇豆、菜豆、菜豆、豌豆	露菌病	0.25-0.4公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		本項修正。
	疫病	0.25-0.4公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		本項修正。
落花生	銹病	0.25-0.4公斤	2,000	病害發生初期開始	7			7		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				施藥。						
油菜	露菌病	0.06-0.3公斤	4,000	病害發生初期開始施藥。	7			7	適用於油菜籽。	
茶	<u>赤葉枯病</u>	0.2-0.7公斤	4,500	病害發生初期開始施藥。	7			21	適用於茶籽。	本項修正。
油茶	<u>赤葉枯病</u>	0.2-0.7公斤	4,500	病害發生初期開始施藥。	7			21		本項修正。
胡麻	疫病	0.3-0.6公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		
胡麻	疫病	0.3-0.6公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			7	1. 避免與高浸透性展著劑混合使用。 2. 高溫下施用，注意避免發生藥害。	重複範圍，本項刪除。
十字花科包葉菜類	露菌病	0.25 公斤	4,000	病害發生初期開始施藥。	7	3		15		
菊科包葉菜類	露菌病	0.05-0.25 公斤	4,000	病害發生初期開始施藥。	7			15		重複範圍，本項刪除。
<u>結球萵苣</u>	疫病	0.15-0.5公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			15		本項修正。
結球萵苣	露菌病	0.05-0.25 公斤	4,000	病害發生初期開始施藥。	7			15		
旋花科小葉菜	露菌病	0.2 公斤	4,500	病害發生初期開始	7			10	避免與高浸透性展著劑	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
類				施藥。					混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
旋花科 小葉菜 類	白銹病	0.2 公 斤	4,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			10	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
豆科小 葉菜類	露菌病	0.2 公 斤	4,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			10	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
豌豆	疫病	0.3-0.4 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10	適用於葉用 豌豆。	
十字花 科小葉 菜類	露菌病	0.06-0.3 公斤	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
菊科小 葉菜類	露菌病	0.2 公 斤	4,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			10	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
菊科小 葉菜類	疫病	0.15-0.5 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
菊科小 葉菜類	白銹病	0.2 公 斤	4,500	病害發生 初期開始	7			10	避免與高浸 透性展著劑	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				施藥。					混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
不結球 萵苣與 半結球 萵苣	露菌病	0.25 公 斤	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		12	採收前 10 天(設施栽 培 12 天) 停止施藥。	與大類 範圍重 疊，本 項刪 除。
茄科小 葉菜類	疫病	0.25- 0.75 公 斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			12	採收前 6 天 (設施栽培 12 天)停止 施藥。	
蔥科小 葉菜類	紫斑病	0.2-0.25 公斤	6,000	病害發生 初期開始 施藥。	10			10		
蔥科小 葉菜類	露菌病	0.2 公 斤	4,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			10	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
蔥科小 葉菜類	疫病	0.4-1 公 斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
萵	紫斑病	0.2 0.25 公斤	6,000	病害發生 初期開始 施藥。	10			10		與大類 範圍重 疊，本 項刪 除。
韭	紫斑病	0.2 0.25 公斤	6,000	病害發生 初期開始 施藥。	10			10		與大類 範圍重 疊，本 項刪 除。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
葫蘆科 小葉菜 類	露菌病	0.2 公 斤	4500	病害發生 初期開始 施藥。	7			6	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
龍鬚菜	疫病	0.4-1 公 斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
繖形花 科小葉 菜類	葉斑病	0.2 公 斤	4,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			10	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
羅勒	露菌病	0.2 公 斤	4,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			10	避免與高浸 透性展著劑 混合使用， 避免於高溫 多濕下施 用，以免發 生藥害。	
羅勒	疫病	0.1-0.4 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
紫蘇	疫病	0.1-0.4 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
仙草	疫病	0.1-0.4 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
薄荷	疫病	0.1-0.4 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
藜科小	露菌病	0.2 公	4,500	病害發生	7			10	避免與高浸	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
葉菜類		斤		初期開始施藥。					透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
菠菜	露菌病	0.05-0.25 公斤	4,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		與大類範圍重疊，本項刪除。
莧科小葉菜類	露菌病	0.2 公斤	4,500	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
莧科小葉菜類	白銹病	0.2 公斤	4,500	病害發生初期開始施藥。	7			10	避免與高浸透性展著劑混合使用，避免於高溫多濕下施用，以免發生藥害。	
莧菜	疫病	0.2-0.5 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
香椿	疫病	0.1-0.5 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
豆科根菜類	露菌病	0.25 公斤	4,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		
豆科根菜類	疫病	0.25-0.4 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科根菜類	露菌病	0.06-0.3公斤	4,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
菊科根菜類	露菌病	0.25 公斤	4,000	病害發生初期開始施藥。	7			7		
茄科根菜類	疫病	0.25-0.75 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			12	採收前 6 天(設施栽培 12 天)停止施藥。	
馬鈴薯	晚疫病	0.5 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			6		
蔥科根菜類	紫斑病	0.2-0.25 公斤	6,000	病害發生初期開始施藥。	10			10		
蔥科根菜類	露菌病	0.25 公斤	4,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
蔥科根菜類	疫病	0.4-1 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
甜菜	疫病	0.1-0.4 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
薑	疫病	0.5-0.6 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		
薑	疫病	0.45-0.6 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			10		重複範圍，本項刪除。
金針	疫病	0.4-1 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			6	適用於碧玉筍。	
芋	疫病	0.4-0.6 公斤	2,000	病害發生初期開始	7			10		重複範圍，本

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				施藥。						項刪 除。
芋	疫病	0.4-0.6 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			10		
茄科果 菜類	疫病	0.25- 0.75 公 斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			12	採收前 6 天 (設施栽培 12 天)停止 施藥。	
番茄	晚疫病	0.5 公 斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
金針	疫病	0.4-1 公 斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6	適用於金針 花	
洛神葵	疫病	0.3-0.6 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
秋葵	疫病	0.3-0.6 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
瓜菜類	疫病	0.4-1 公 斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
胡瓜	露菌病	0.25 公 斤	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	3		6		
豆菜類	露菌病	0.25 公 斤	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			14		
豆菜類	疫病	0.25-0.4 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			14	豆菜類採收 前 14 天、 豆苗採收前 10 天停止 施藥。	
瓜果類	露菌病	0.25 公 斤	4,000	病害發生 初期開始	7	3-4		6		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				施藥。						
瓜果類	疫病	0.4-1 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			6		
木瓜	疫病		2,000	雨季來臨時施藥。	7			9		
木瓜	炭疽病		5,000	開花盛期施藥。	10			9		
番荔枝	炭疽病	0.2-0.4 公斤	4,000	開花初期施藥。	7			12		
酪梨	炭疽病		4,000	開花結果期及套袋前施藥。	10-14	各 2 次		6		
紅龍果	炭疽病	0.2-0.4 公斤	4,000	開花初期施藥。	7			12		
百香果	炭疽病	0.2-0.4 公斤	4,000	開花初期施藥。	7			12		
紅毛丹	炭疽病	0.15-0.3 公斤	4,000	開花初期施藥。	7			12		
草莓	果腐病	0.4-1 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			12	採收前 6 天(設施栽培 12 天)停止施藥。	重複範圍，本項刪除。
草莓	果腐病	0.4-1 公斤	2,000	病害發生初期開始施藥。	7			12	採收前 6 天(設施栽培 12 天)停止施藥。	
葡萄	露菌病	0.3 公斤	4,000	病害發生初期開始施藥。	7-10	3-4		6		
葡萄	晚腐病	0.2-0.4 公斤	4,000	病害發生初期開始施藥。	7			6	施藥至套袋前為止。	
楊桃	炭疽病	0.2-0.4 公斤	4,000	開花初期施藥。	7			12	施藥至套袋前為止。	
蓮霧	炭疽病		6,000	開花盛期施藥。	10	5-8	結果後每 14 天	6		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
							施一 次。			
番石榴	炭疽病		4,000	花謝後施 藥。	10			21	於套袋前可 再施藥一 次，待藥液 乾後立即套 袋。	
無花果	炭疽病	0.2-0.4 公斤	4,000	小果期施 藥。	7			12		
龍眼	炭疽病	0.2-0.3 公斤	4,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
荔枝	炭疽病		4,000	雨季來臨 時或病害 發生初期 開始施藥	7			12	與其他藥劑 輪流施用可 避免抗藥性 產生。	
檬果	炭疽病		4,000	開花初期 施藥。	7	4	結果後 每 14 天 施一 次。	12	同一季節避 免施六次。	
梨	炭疽病	0.25-0.5 公斤	4,000	開花初期 施藥。	7			6		
梨	輪紋病		6,000	花謝後施 藥。	10-14	6		6		
蘋果	炭疽病	0.25-0.3 公斤	4,000	開花初期 施藥。	7			9		
桃	炭疽病	0.25-0.5 公斤	4,000	開花初期 施藥。	7			9		
梅	炭疽病	0.3-0.45 公斤	4,000	開花初期 施藥。	7			9		
枇杷	炭疽病	0.4-0.5 公斤	4,000	開花初期 施藥。	7			9		
鼠李科 梨果類	炭疽病		6,000	病害發生 初期開始 施藥。	10-14	2-3		9		
柿	炭疽病	0.25-0.4 公斤	4,000	開花初期 施藥。	7			9		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
柑桔類	炭疽病	0.2-0.5 公斤	4,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			6		
柑桔類	瘡痂病		6,000	花苞將開 放時行第 一次施 藥，結小 果時行第 二次施 藥，隔三 星期再行 第三次施 藥。		3		6	1. 每公頃 之施藥 量視植 株大小 而異， 藥量可 酌情增 減。 2. 剪除植 株病患 部位， 另田間 之落 花、枯 枝與落 果，均 須清除 並燒燬 之。	
椰子	炭疽病	0.1-0.4 公斤	4,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			12		
花木	露菌病	0.3-1.3 公斤	2,000	發病初期 開始施 藥。	7	最多 2 次			限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
花木	疫病	0.3-1.3 公斤	2,000	發病初期 開始施 藥。	7	最多 2 次			限觀賞花卉 使用，使用 前宜先進行 小面積藥害 測試。	
花木	炭疽病	0.3-1.3 公斤	2,000	發病初期 開始施	7	最多 2 次			限觀賞花卉 使用，使用	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
				藥。					前宜先進行 小面積藥害 測試。	
菊	露菌病	0.1-0.3 公斤	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
菊	疫病	0.15-0.6 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
山茶	<u>赤葉枯 病</u>	0.2-0.7 公斤	4,500	病害發生 初期開始 施藥。	7					本項修 正。
茶	<u>赤葉枯 病</u>	0.2-0.7 公斤	4,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			21	適用於茶 葉。	本項修 正。
茶	赤葉枯 病	0.25- 0.75公 斤	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		重複範 圍，本 項刪 除。
黃耆	露菌病	0.1-0.2 公斤	4,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
黃耆	疫病	0.3-0.4 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
當歸	疫病	0.1-0.4 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
丹參	疫病	0.1-0.4 公斤	2,000	病害發生 初期開始 施藥。	7			21		
咖啡	炭疽病	0.2-0.3 公斤	4,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			14	避免與滲透 性強的展著 劑混合使 用，以免發 生藥害。	
地黃	疫病	0.1-0.4	2,000	病害發生	7			21		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事項	說明
		公斤		初期開始 施藥。						
可可	炭疽病	0.2-0.4 公斤	4,500	病害發生 初期開始 施藥。	7			14	避免與滲透 性強的展著 劑混合使 用，以免發 生藥害。	
百慕達 草	褐斑病	0.35 公 斤	3,000	病害發生 初期開始 施藥。	10	3				