

「三氟派瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 10 月 24 日農授防字第 1131876880B 號公告修正

500 g/L (50% w/v) 三氟派瑞 水懸劑 (SC)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
十字花科 包葉菜類	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	共 2 次		14		
結球萵苣	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	共 2 次		14		
十字花科 小葉菜類	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開 始施藥。	7	共 2 次		10		
不結球萵 苣與半結 球萵苣	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開 始施藥。	7	共 2 次		10		
茼蒿	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開 始施藥。	7	共 2 次		10		
山茼蒿	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開 始施藥。	7	共 2 次		10		
紅鳳菜	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開 始施藥。	7	共 2 次		10		
白鳳菜	炭疽病	0.1-0.4 公升	2,500	本葉期開 始施藥。	7	共 2 次		10		
蔥	炭疽病	0.3-0.8 公升	2,500	定植後開 始施藥。	7	共 2 次		10		
韭	炭疽病	0.3-0.8 公升	2,500	定植後開 始施藥。	7	共 2 次		10	採收韭 菜花者 不得使 用。	
菠菜	炭疽病	0.1-0.3 公升	2,500	本葉期開 始施藥。	7	共 2 次		10		
番茄	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	共 2 次		7	避免重 複使用 氟派瑞 單劑。	
甜椒	炭疽病	0.4 公	2,500	病害發生	7	共 2		7	避免重	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
		升		初期開始 施藥，全 株均勻噴 施。		次			複使用 氟派瑞 單劑。	
辣椒	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	共 2 次		7	避免重 複使用 氟派瑞 單劑。	
茄子	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	共 2 次		7	避免重 複使用 氟派瑞 單劑。	
枸杞	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	共 2 次		7	避免重 複使用 氟派瑞 單劑。	
香瓜茄	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	共 2 次		7	避免重 複使用 氟派瑞 單劑。	
樹番茄	炭疽病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	共 2 次		7	避免重 複使用 氟派瑞 單劑。	
瓜菜類	炭疽病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 2 次		7	避免重 複使用 氟派瑞 單劑。	
胡瓜	白粉病	0.1 公 升	9,000	病害發生 初期開始 施藥。	7	共 2 次		3	避免重 複使用 氟派瑞 單劑。	
瓜果類	炭疽病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 2 次		7	避免重 複使用 氟派瑞 單劑。	
香蕉	炭疽病	0.09-	4,000	謝花幼果	14			18	避免重	本項修

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
		0.3 公 升		<u>期開始施 藥。</u>					複使用 氟派瑞 單劑。	正。
木瓜	炭疽病	0.2-0.7 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14			18		本項修 正。
番荔枝	炭疽病	0.2-0.5 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14			18		本項修 正。
酪梨	炭疽病	0.3-0.7 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14			18		本項修 正。
紅龍果	炭疽病	0.3-0.5 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14			18		本項修 正。
百香果	炭疽病	0.3-0.5 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14			18		本項修 正。
紅毛丹	炭疽病	0.2-0.4 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14			18		本項修 正。
草莓	炭疽病	0.3-0.8 公升	2,500	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	7	2		7	避免重 複使用 氟派瑞 單劑。	本項修 正。
葡萄	晚腐病	0.3-0.5 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14			7		本項修 正。
楊桃	炭疽病	0.3-0.5 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14			7		本項修 正。
蓮霧	炭疽病	0.3-1 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14			7		本項修 正。
番石榴	炭疽病	0.4-0.7 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14			7		本項修 正。

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
無花果	炭疽病	0.3-0.5 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14			7		本項修 正。
龍眼	炭疽病	0.3-0.5 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14			18		本項修 正。
荔枝	炭疽病	0.2-0.4 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14			18		本項修 正。
檬果	炭疽病	0.3 公 升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14			18	結果後 每隔 14 天施藥 1 次至套 袋前為 止。	本項修 正。
蘋果	炭疽病	0.1-0.8 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14	最多 4 次		14		本項修 正。
桃	炭疽病	0.1-0.8 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14	最多 4 次		14		本項修 正。
梅	炭疽病	0.1-0.8 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14	最多 4 次		14		本項修 正。
印度棗	炭疽病	0.3-0.4 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14	最多 4 次		14		本項修 正。
柿	炭疽病	0.3-0.5 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14			18		本項修 正。
柑桔類	炭疽病	0.5 公 升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14	共 3 次		14		本項修 正。
椰子	炭疽病	0.2-0.7 公升	4,000	<u>謝花幼果 期開始施 藥。</u>	14			18		本 項 修 正。
山茶科茶	赤葉枯	0.3-1	4,000	病害發生	14			14		

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
類	病	公升		初期開始 施藥。						
梨	炭疽病	0.3 公 升	4,000	謝花幼果 期開始施 藥。	14	共 3 次		14		本項新 增。